

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Az emlő ultrahang vizsgálatáról

Kedves Betegünk!

Az emlőultrahang a körülírt eltérések (cysta, daganat) igazolásában nagyon pontos, de nem csálhatatlan vizsgálati módszer.

A tapintható elváltozsról ultrahang vizsgálattal eldönthető, hogy folyadéktartalmú (cysta), vagy szöveti szerkezetet mutat, hogy egymagában vagy többbedmagával van-e jelen. Az eredmény ismeretében lehet dönteni arról, hogy kontroll ultrahang, mintavétel illetve további vizsgálatok szükségesek-e.

A nagy feloldóképességű vizsgálófej segítségével megállapíthatóak a tejutak tágulatai, a mirigyállomány gyulladáson folyamatai is.

35 év felett az emlőszervezetből adódóan ultrahang vizsgálattal önmagában nem deríthető fel valamennyi korai emlőrák. A pontosabb véleményalkotáshoz, az esetleges rosszindulatú folyamat biztosabb felismeréséhez emiatt (néhány kivételtől eltekintve) bizonyos időszakonként a mammográfia elkészítése is szükséges.

A vizsgálat az emlők, valamint a kétoldali hónaljárok, kulcsfont alatti területek, valamint a szegycsont környezetének a vizsgálatát is tartalmazza, melynek során megnagyobbodott, kóros nyirokcsomókat is fel lehet ismerni.

Előkészítés:

A vizsgálat különleges előkészítést nem igényel. A vizsgálatnál az emlőket kell szabaddá tenni, tehát célszerű úgy öltözni, hogy e terület egészen a derékig könnyen szabaddá tehető legyen.

A vizsgálat átlagos hossza: 15-20 perc.

A fent leírtaknak megfelelően az emlők ultrahangos vizsgálata nagyon fontos, de nem csálhatatlan módszer. Ezért a vizsgálatok között az emlő havi rendszeres önvizsgálata feltétlenül szükséges. Ezt lehetőleg ugyanabban az időben, a vérzés elmúltával ajánlott megtenni. Amennyiben számottevő változást észlel az emlők állagában, csomót tapint, véres váladékozást vagy nem múló bőrpírt lát, akkor forduljon kezelőorvosához vagy jelentkezzen ismételt vizsgálatra.