

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

### A nyelőcső és gyomor báriumos kontrasztanyaggal történő röntgenvizsgálatáról

Kedves Betegünk!

**A vizsgálat csaknem teljesen ellenjavallt terhesség fennállása vagy annak gyanúja esetén is.**

**Kérjük, a vizsgálat megkezdése előtt minden ismert gyógyszerérzékenységről számoljon be a beavatkozást végző orvosnak!**

**1. Az eljárás célja:** A nyelőcső, a gyomor és a patkóbél nyálkahártyán lévő fekélyes, gyulladós eltérések, daganatos folyamatok, illetve egyéb elváltozások kimutatása.

**2. Az eljárás technikája:** A nyelés vizsgálat során a kontrasztanyagból (röntgenárnyékot adó folyadékból) több kortyot kell lenyelnie, az utasításnak megfelelő ütemben. A kontrasztanyag a tápcsatorna belvilágát kirajzolja, útja röntgen átvilágítással követhető, ebből bizonyos kórfolyamatokra következtethetünk. A gyomor kettőskontrasztos vizsgálata a nyelésvizsgálathoz hasonlóan zajlik, de előbb szódabikarbóna-szerű porból kiskanálnyi mennyiséget kell lenyelni, ez a gyomorban gázképződéshez vezet, az így „felfújtt” gyomorban a kóros eltérések könnyebben felfedezhetők. A gyomor falán a kontrasztanyagot fekvő helyzetben, körbefordulva oszlatjuk szét. A kontrasztanyag gyomorból való kiürülését is megfigyeljük.

**3. Az eljárás esetleges veszélyei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:** A vizsgálatához használt báriumos kontrasztanyagnak a szervezetre gyakorolt általános mellékhatása nincs. Ha valaki félrenyelte a kontrasztanyagot, akkor jórészt kiköhögi, és csak nagyon ritkán (főleg idős, legyengült betegeken, illetve kóros összeköttetés esetén a nyelőcső és a légső között) okoz a tüdőben gyulladást, vagy egyéb elváltozást. Székrekedéssel betegeknél előfordulhat, hogy nehezen ürül ki, esetleg beöntés adását is szükségessé teheti.

**4. Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei, egyéb lehetőségek:** A vizsgálat elmaradása megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a pontos diagnózis megállapítását, így kezelési terv sem alakítható ki, ami súlyos állapotromláshoz vezethet.

**5. Amire a betegnek figyelnie kell a beavatkozás után:** a báriumos kontrasztanyag székrekedést okozhat. Ha vizsgálat után fokozódó hasfájása vagy erős hasi görcsei jelentkeznek haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát vagy a legközelebbi sürgősségi osztályt!

**KÉRJÜK, VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE!** Válaszait aláhúzással, X-el, vagy bekarikázással jelölje!

**Kapott-e már korábban röntgen kontrasztanyagot valamilyen korábbi vizsgálata során?** (bél feltöltéses vizsgálat, szájon át alkalmazott kontrasztanyag, CT vizsgálat, röntgen-vesefestés, szívkatéterezés, érfestés, stb.)

NEM       IGEN       NEM TUDOM

**Ha kapott már kontrasztanyagot, voltak-e allergiás tünetei?**

NEM       IGEN Írja le a tüneteket:.....

**Van-e bárium-szulfát allergiája ?**       NEM       IGEN       NEM TUDOM

**Tud-e valamilyen gyógyszer, vegyszer érzékenységről, ha igen, mire allergiás?**

NEM       IGEN Soroljafel:.....

.....  
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

**A tájékoztató elolvasását követően, amennyiben további kérdései lennének, bizalommal fordulhat a beavatkozást végző orvoshoz.**