

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

A vékonybél kettős-kontrasztanyaggal szondán át történő röntgenvizsgálat végzéséhez

Kedves Betegünk!

A vizsgálat csaknem teljesen ellenjavallt terhesség fennállása vagy annak gyanúja esetén is.

Kérjük, a vizsgálat megkezdése előtt minden ismert gyógyszerérzékenységről számoljon be a beavatkozást végző orvosnak!

- Az eljárás célja:** A vékonybél kontrasztanyaggal való feltöltése, elváltozásainak ábrázolására.
- Az eljárás technikája:** A vizsgálat a garat érzéstelenítésével kezdődik, melyek Lidocain-spray-vel végzünk. A megfelelő vékony szondát orron vagy szájon keresztül vezetjük a gyomron át a vékonybél kezdeti szakaszába. A szondán keresztül báriumos kontrasztanyagot, ill. methylcellulose vizes oldatát adunk be. A vékonybélbe juttatott folyadék (kb. 1,5 l) enyhe feszítő érzést okozhat. A kontrasztanyag útját röntgenátvilágítással követjük, és különféle testhelyzetekben felvételeket készítünk.
- Az eljárás esetleges veszélyei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:** A vizsgálatához használt báriumos kontrasztanyag nem mérgező, a szervezetre gyakorolt általános mellékhatása nincs. Ha valaki félrenyel a kontrasztanyagot, akkor jórészt kikövhögi, és csak nagyon ritkán (főleg idős, legyengült betegeken, illetve kóros összeköttetés esetén a nyelőcső és a légső között) okoz a tüdőben gyulladást, vagy egyéb elváltozást. Nagyon ritkán előfordulhat (általában idős, legyengült betegeknél, akiknél a fájdalomérzés sem megfelelő mértékű, vagy súlyosan károsodott a bélfal) a kontrasztanyag töltése közben a bélfal megrepedhet, ezáltal a kontrasztanyag kijut a bélből a hasüregbe, ahol súlyos gyulladást okozhat. Ez a szövödmény sürgős műtétet tesz szükségessé. A helyi érzéstelenítéshez használt Lidocain az erre érzékeny betegeknél túlérzékenységi reakciót válthat ki, mely általában enyhe tünetek (pl. bőrpír, viszketés, csalánkiütés, hányinger) formájában jelentkezik, igen ritkán légzési és keringési panaszok is előfordulhatnak, tízezrelékes nagyságrendben pedig súlyos allergiás reakcióval járhat. A mellékhatások elhárítására osztályunk fel van készülve, a szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak.
- Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei, egyéb lehetőségek:** A vizsgálat elmaradásával pontos diagnózis hiányában az orvos nem tudja az Önél szükséges kezelési eljárásokat alkalmazni, emiatt súlyos állapotromlás következhet be.
- Amire a betegnek figyelnie kell a beavatkozás után:** A viszonylag nagy mennyiségű bélbe juttatott folyadék hasmenést okozhat. Ha a vizsgálat kapcsán osztályunkról való távozását követően kifejezett hasi fájdalom lépne fel, azonnal jelentkezzen kezelőorvosánál vagy a legközelebbi sürgősségi osztályon!

KÉRJÜK, VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! Válaszait aláhúzással, X-el, vagy bekarikázással jelölje!

Kapott-e már korábban röntgen kontrasztanyagot valamilyen korábbi vizsgálat során? (bél feltöltéses vizsgálat, szájon át alkalmazott kontrasztanyag, CT vizsgálat, röntgen-vesefestés, szívkatóterezés, érfestés, stb.)

NEM IGEN NEM TUDOM

Ha kapott már kontrasztanyagot, voltak-e allergiás tünetei?

NEM IGEN Írja le a tüneteket:.....

Van-e bárium-szulfát, methylcellulose allergiája ? NEM IGEN NEM TUDOM

Tud-e valamilyen gyógyszer, vegyszer érzékenységről, ha igen, mire allergiás?

NEM IGEN Sorolja fel:.....

.....
a beteg vagy törvényes képviselő aláírása

A tájékoztató elolvasását követően, amennyiben további kérdései lennének, bizalommal fordulhat a beavatkozást végző orvoshoz.